

مستمر في البطن

- ضيق في التنفس، ألم في الصدر، تورم في الساق أو ألم
- كدمات أو نزيف جديد غير مفسر
- الضعف أو النعاس أو التوربات
- صعوبة في الكلام
- عدم وضوح الرؤية والغثيان والقيء
- صداع غير عادي قد يصاحبه؛
- صداع الذي يبدو أسوأ عند الاستلقاء أو الانحناء.
- يزداد سوءاً.
- صداع حاد جديد لا يساعده مسكنات الألم المعتادة أو السريعة:

أسبوع، و لا يصاب بها الكل.
على الرغم من أن الآثار الجانبية الخطيرة نادرة جداً، إذا واجهت أي مما يلي من حوالي اليوم 4 إلى 4 أسابيع بعد التطعيم يجب عليك طلب المشورة الطبية على وجه السرعة:

هل يمكن أن يصبني اللقاح بمرض الكوفيد-19؟
لقاح الكوفيد لا يصيبك بمرض الكوفيد-19 ولكن مثل جميع الأدوية، يمكن أن تسبب اللقاحات آثاراً جانبية. معظم هذه الآثار خفيفة وقصيرة الأجل، وتستمر لمدة لا تزيد عن أسبوع، و لا يصاب بها الكل.

هل يمكن أن يصبني اللقاح بمرض الكوفيد-19؟
للقاح الكوفيد-19 ولكن لا يمكنني أن أجد أي من اللقاحات حسب الحساسية لديه ولكن الآن يتم عرض اللقاح الداعم (booster) لمن لم يمتد من الامن بالنسبة لحي الأجدء؛

تم تحديث الإشادات المتعلقة بالحساسية منذ بدء التطعيم الأولي الكوفيد-19. أحدث الإشادات في الكتاب الأخصر تقول أنه يمكنك الحصول على أي لقاح إذا كان لديك تاريخ من الحساسية السابقة (نصا في تلك الحساسية المفرطة) إلى:

- الطعام
- لدغة الحشرات
- معظم الأدوية
- تاريخ عائلي للحساسية
- رد فعل غير نظامي سابق على اللقاح
- فرط الحساسية للأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية مثل الأسبرين، الإيبوبروفين
- مرض كثرة الخلايا البيضاء

سيتم عرض مواعيد له للقاحات الأخرى فقط.

نسبة خطر التجلط عالية وإن كان الشخص صغيراً للغاية، وكإجراء وقائي، لن يعرض على الأشخاص الذين يكون أيضاً من المضاعفات الشائعة للعدوى بمرض الكوفيد. تحدث حالات مماثلة بشكل طبيعي، ومشاكل التخثر هي بعد التطعيم بلقاح استرازينيكا AstraZeneca. يمكن أن يحدث هناك تقارير عن حدث سلبي نادر للغاية ينطوي على جلطات دموية مع مستويات منخفضة من الصفائح الدموية بعد التطعيم بلقاح استرازينيكا AstraZeneca. يمكن أن تحدث حالات مماثلة بشكل طبيعي، ومشاكل التخثر هي أيضاً من المضاعفات الشائعة للعدوى بمرض الكوفيد.

هل يجب أن ألق بـشأن جلطات الدم؟

كانت هناك تقارير عن حدث سلبي نادر للغاية ينطوي على جلطات دموية مع مستويات منخفضة من الصفائح الدموية بعد التطعيم بلقاح استرازينيكا AstraZeneca. يمكن أن تحدث حالات مماثلة بشكل طبيعي، ومشاكل التخثر هي أيضاً من المضاعفات الشائعة للعدوى بمرض الكوفيد.

وتم اختبارها على عشرات الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم.

كبيرة؟

وقد تم تطوير لقاحات الكوفيد بسرعة بسبب جهود الخبراء في جميع أنحاء العالم التي تركز على تطوير هذا اللقاح.

وقد شهدت اللقاحات ثلاث مراحل من التجارب السريرية

هل لقاحات الكوفيد غير آمنة لأنها تم تطويرها بسرعة كبيرة؟

سواء لنفسك وللأشخاص المعرضين للخطر من حولك.

التطعيم هو خيار، ولكن أخذ اللقاح يوفر لك الحماية

Comfrey Project Covid Vaccine Myths

(Comirnaty)

The Comfrey Project Covid Vaccine Myths

(Comirnaty)

The Comfrey Project contact information:

Website: www.thecomfreyproject.org.uk

Phone: 01914477801 Mobile: 07795320706

بلدية القيسيد معلومات الكوفيد 19:

www.gateshead.gov.uk/Coronavirus

www.gateshead.gov.uk/communitychampions

استخدم خيار الاستماع والتسجيل الموجود في الجزء السفلي من أي صفحة ويب للمجلس اللدني القيسيد لاستخدام أداة الترجمة.

تطلب على كوفيد نورث إيست:
تتوفر موارد الفيديو بلغات مختلفة

www.beatcovidne.co.uk

فوائد التطعيم ومخاطره

العمر	الخطر من الإصابة بكوفيد-19	مخاطر اللقاح	فوائد اللقاح
الأشخاص بعمر 50 عاما أو أكثر أو الذين يعانون من أمراض صحية مزمنة	مرتفع جدًا - الدخول إلى المستشفى, الدخول للعناية المركزة ، الوفاة. متوسط - إصابة طويلة بالكوفيد	غير شائعة - ألم في الذراع , شعور بالتعب , صداع الأم عامة , أعراض شبيهة بالإنفلونزا. مشاكل التجلط (حوالي 1 من كل 100,000 جرعة أولى)	الحصول على جرعة واحدة تقلل بأكثر من 80% الوفيات , الدخول إلى المستشفى, العناية المركزة. الحصول على جرعتين يقلل بأكثر من 95% : الوفيات.
الأشخاص من عمر 40 ل 49 عاما	مرتفعة - فرصة الإصابة بالعدوى ونقلها متوسط - الدخول إلى المستشفى, الدخول للعناية المركزة ، الوفاة. إصابة طويلة بالكوفيد	شائعة - ألم في الذراع , شعور بالتعب , صداع الأم عامة , أعراض شبيهة بالإنفلونزا. مشاكل التجلط - نادرة جدا (حوالي 1 من كل 100,000 جرعة أولى)	الحصول على جرعة واحدة تقلل بأكثر من 80% الوفيات , الدخول إلى المستشفى, العناية المركزة. الحصول على جرعتين يقلل بأكثر من 95% : الوفيات
الأشخاص من عمر 30 ل 39 عاما	مرتفعة - فرصة الإصابة بالعدوى ونقلها متوسط - إصابة طويلة بالكوفيد	شائعة - ألم في الذراع , شعور بالتعب , صداع الأم عامة , أعراض شبيهة بالإنفلونزا. مشاكل التجلط - نادرة جدا (حوالي 1 من كل 50,000 جرعة أولى)	الحصول على جرعة واحدة يقلل بنسبة بين 60%-70%: التقاط ونقل العدوى الحصول على جرعتين يقلل بأكثر من 85% : التقاط ونقل العدوى
الأشخاص من عمر 18 ل 29 عاما	عالي جدا - فرصة الإصابة بالعدوى ونقلها متوسط - إصابة طويلة بالكوفيد منخفض جدا - الدخول إلى المستشفى, الدخول للعناية المركزة ، الوفاة.	شائعة جدا - ألم في الذراع , شعور بالتعب , صداع الأم عامة , أعراض شبيهة بالإنفلونزا. مشاكل التجلط - نادرة جدا (حوالي 1 من كل 50,000 جرعة أولى)	الحصول على جرعة واحدة يقلل بنسبة بين 60%-70%: التقاط ونقل العدوى الحصول على جرعتين يقلل بأكثر من 85%: التقاط ونقل العدوى