

يُعطى للبالغين والمراهقين من سن 12 عامًا فما فوق
الناجم عن SARS-CoV-2
هو لقاح يستخدم للوقاية من الكوفيد 19 الناجم عن
ما هو لقاح Comirnaty
بما أن لقاح **Comirnaty** لا يحتوي على الفيروس لإنتاج
المناعة فإنه لا يمكن أن يتسبب لك بالكوفيد 19 .
كيف يعمل اللقاح
يتسبب اللقاح في قيام الجهاز المناعي (دفاعات الجسم
الطبيعية) بإنتاج الأجسام المضادة وخلايا الدم التي تعمل
ضد الفيروس ، مما يوفر الحماية من فايروس الكوفيد
بما أن لقاح **Comirnaty** لا يحتوي على الفيروس لإنتاج
المناعة فإنه لا يمكن أن يتسبب لك بالكوفيد 19 .
بعد التطعيم؟
ما هي مخاطر التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور
9 كل 1 مليون جرعة لالتهاب عضلة القلب و
Comirnaty
7 لكل 1 مليون جرعة لالتهاب التامور (بيانات MHRA)
AstraZeneca: 3 كل 1 مليون جرعة لالتهاب عضلة القلب
4 لكل 1 مليون جرعة لالتهاب التامور (بيانات MHRA)
Moderna: 32 كل 1 مليون جرعة لالتهاب عضلة القلب
20 لكل 1 مليون جرعة لالتهاب التامور (بيانات MHRA)

بما أن لقاح **Comirnaty** لا يحتوي على الفيروس لإنتاج
المناعة فإنه لا يمكن أن يتسبب لك بالكوفيد 19 .
كيف يعمل اللقاح
يتسبب اللقاح في قيام الجهاز المناعي (دفاعات الجسم
الطبيعية) بإنتاج الأجسام المضادة وخلايا الدم التي تعمل
ضد الفيروس ، مما يوفر الحماية من فايروس الكوفيد
بما أن لقاح **Comirnaty** لا يحتوي على الفيروس لإنتاج
المناعة فإنه لا يمكن أن يتسبب لك بالكوفيد 19 .

بما أن لقاح **Comirnaty** لا يحتوي على الفيروس لإنتاج
المناعة فإنه لا يمكن أن يتسبب لك بالكوفيد 19 .
كيف يعمل اللقاح
يتسبب اللقاح في قيام الجهاز المناعي (دفاعات الجسم
الطبيعية) بإنتاج الأجسام المضادة وخلايا الدم التي تعمل
ضد الفيروس ، مما يوفر الحماية من فايروس الكوفيد
بما أن لقاح **Comirnaty** لا يحتوي على الفيروس لإنتاج
المناعة فإنه لا يمكن أن يتسبب لك بالكوفيد 19 .

Comfrey Project Covid Vaccine Myths

(Comirnaty)

The Comfrey Project Covid Vaccine Myths
(Comirnaty)

The Comfrey Project contact information:

Website: www.thecomfreyproject.org.uk

Phone: 01914477801 **Mobile:** 07795320706

بلدية القتيبيد معلومات الكوفيد 19:

www.gateshead.gov.uk/Coronavirus

www.gateshead.gov.uk/communitychampions

استخدم خيار الاستماع والتشجعة الموجود في الجزء السفلي
من أي صفحة ويب للمجلس البلدي القتيبيد
لاستخدام أداة الترجمة.

تغلب على كوفيد تورت إيست:

تتوفر موارد الفيديو بلغات مختلفة

www.beatcovidne.co.uk

إعطائه .
في الحماية من كوفيد-19 بدءًا من 14 يومًا بعد
ثبت أن لقاح Comirnaty له فعالية تقارب 91.3%
ما مدى فعالية لقاح كوميرناتي؟

جرعة لذلك فهو في الأساس خالي من الفيروس.

أقل من 1ملي مول من الفيروس (23 ملي جم) لكل
في الأساس خالي من الفيروس. يحتوي أيضًا على
من اليوتاسيوم (39 ملي جم) لكل جرعة ، لذلك فهو
يحتوي Comirnaty على أقل من 1ملي مول
لماذا كوميرناتي على ذلك؟
يجب أن أكون حريصًا مع تناول الملح ، فهل سيؤثر

الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر.

أعمارهم عن 12 عامًا ولكن يمكن إعطاه للأشخاص
لا ينصح بلقاح كوميرناتي للأطفال الذين تقل
ما هي الأعمار التي يمكن أن تأخذ هذا اللقاح؟

مما المحتمل الخاطئ الآثار التي

مثل هذا ليست أن نسبة من هذا اللقاح آثارًا
التي هي الآثار الخائبة مثل الألام و / أو
تتولد آثار الخائبة مثل الألام و / أو
تتولد آثار الخائبة مثل الألام و / أو
تتولد آثار الخائبة مثل الألام و / أو

تتولد آثار الخائبة مثل الألام و / أو
تتولد آثار الخائبة مثل الألام و / أو
تتولد آثار الخائبة مثل الألام و / أو
تتولد آثار الخائبة مثل الألام و / أو
تتولد آثار الخائبة مثل الألام و / أو

تشمل الآثار الخائبة الشائعة ما يلي:

- تعب
- موقع الحقن ، ألم وتورم
- تشمل الآثار الخائبة الشائعة ما يلي:
- الصداع الراس
- ألم عضلي
- شعيرة
- ألم الحاصل
- إسهال
- حمى
- احمرار موقع الحقن
- غثيان
- التقيؤ

فوائد التطعيم ومخاطره

| العمر | الخطر من الإصابة بكوفيد-19 | مخاطر اللقاح | فوائد اللقاح |
|--|---|--|---|
| الأشخاص بعمر 50 عاما أو أكثر أو الذين يعانون من أمراض صحية مزمنة | مرتفع جدًا - الدخول إلى المستشفى, الدخول للعناية المركزة ، الوفاة. متوسط - إصابة طويلة بالكوفيد | غير شائعة - ألم في الذراع , شعور بالتعب , صداع الأم عامة , أعراض شبيهة بالإنفلونزا. مشاكل التجلط (حوالي 1 من كل 100,000 جرعة أولى) | الحصول على جرعة واحدة تقلل بأكثر من 80% الوفيات , الدخول إلى المستشفى, العناية المركزة. الحصول على جرعتين يقلل بأكثر من 95% : الوفيات. |
| الأشخاص من عمر 40 ل 49 عاما | مرتفعة - فرصة الإصابة بالعدوى ونقلها متوسط - الدخول إلى المستشفى, الدخول للعناية المركزة ، الوفاة. إصابة طويلة بالكوفيد | شائعة - ألم في الذراع , شعور بالتعب , صداع الأم عامة , أعراض شبيهة بالإنفلونزا. مشاكل التجلط - نادرة جدا (حوالي 1 من كل 100,000 جرعة أولى) | الحصول على جرعة واحدة تقلل بأكثر من 80% الوفيات , الدخول إلى المستشفى, العناية المركزة. الحصول على جرعتين يقلل بأكثر من 95% : الوفيات |
| الأشخاص من عمر 30 ل 39 عاما | مرتفعة - فرصة الإصابة بالعدوى ونقلها متوسط - إصابة طويلة بالكوفيد | شائعة - ألم في الذراع , شعور بالتعب , صداع الأم عامة , أعراض شبيهة بالإنفلونزا. مشاكل التجلط - نادرة جدا (حوالي 1 من كل 50,000 جرعة أولى) | الحصول على جرعة واحدة يقلل بنسبة بين 60%-70%: التقاط ونقل العدوى الحصول على جرعتين يقلل بأكثر من 85% : التقاط ونقل العدوى |
| الأشخاص من عمر 18 ل 29 عاما | عالي جدا - فرصة الإصابة بالعدوى ونقلها متوسط - إصابة طويلة بالكوفيد منخفض جدا - الدخول إلى المستشفى, الدخول للعناية المركزة ، الوفاة. | شائعة جدا - ألم في الذراع , شعور بالتعب , صداع الأم عامة , أعراض شبيهة بالإنفلونزا. مشاكل التجلط - نادرة جدا (حوالي 1 من كل 50,000 جرعة أولى) | الحصول على جرعة واحدة يقلل بنسبة بين 60%-70%: التقاط ونقل العدوى الحصول على جرعتين يقلل بأكثر من 85%: التقاط ونقل العدوى |